



The World's Largest Open Access Agricultural & Applied Economics Digital Library

This document is discoverable and free to researchers across the globe due to the work of AgEcon Search.

Help ensure our sustainability.

Give to AgEcon Search

AgEcon Search
<http://ageconsearch.umn.edu>
aesearch@umn.edu

Papers downloaded from AgEcon Search may be used for non-commercial purposes and personal study only. No other use, including posting to another Internet site, is permitted without permission from the copyright owner (not AgEcon Search), or as allowed under the provisions of Fair Use, U.S. Copyright Act, Title 17 U.S.C.

No endorsement of AgEcon Search or its fundraising activities by the author(s) of the following work or their employer(s) is intended or implied.



caribbean food crops society

17

**Seventeen
Annual Meeting
November 1981
VENEZUELA**

Vol. XVII

QUELQUES OBSERVATIONS SUR LE CYCLE VEGETATIF DE DIOSCOREA ALATA C.V. TAHITI SUIVANT LES DATES DE PLANTATION

R. ARNOLIN

G. ANAIS

Institut National de la Recherche Agronomique
(INRA). Station d'Amélioration des Plantes
Domaine Duclos.
PETIT-BOURG (Guadeloupe)

RESUME

Des leur récolte en Janvier 1979 puis en Décembre 1979, des bulilles de D. alata c.v. Tahiti sont placées à 18° C et 80% d'hygrométrie. Elles serviront à planter 12 bulilles chaque mois.

- 1) En conservation, on constate que la température de 18° C provoque le ralentissement de l'évolution physiologique des bulilles avec une germination tardive, peu abondante qui aboutit à la formation de bulilles-filles après 12 mois.
- 2) Au champ, le repos végétatif est de l'ordre de 90 jours.
- 3) La durée de végétation décroît de la plantation de Janvier à la plantation de Novembre en passant de 250 à 113 jours. La production moyenne de tubercules par plante est en bonne corrélation avec la durée du cycle.
- 4) Les plantations de Janvier à Juin ont une fanaison groupée. Les bulilles agées d'un an placées en Décembre et en Janvier donnent des plantes dont les durées de végétation sont anarchiques. Les bulilles agées de 12 mois et plus, placées à partir de Février donnent des plantes vigoureuses ayant un cycle semblable à celui des plantes issues de plants normaux. Cela conduit à penser que si l'état d'évolution interne de la bulille conditionne l'évolution de la plante qui en est issue dans certaines conditions, lorsque les jours redévient croissants, l'influence du milieu devient prépondérante sur l'état physiologique de la bulille-mère.

SUMMARY

Some observations on the vegetation cycle of the Yam Dioscorea alata c.v. Tahiti in relation of the plantation's date.

From their harvest in January 1979 then in December 1979 bulbils from D. alata c.v. Tahiti are placed at 18° C temperature and 80% hygrometry. Then 12 bulbils are planted each month.

- 1) At 18° C physiological evolution of bulbils is slow, the germination is late and daughter bulbils are formed after 12 months.
- 2) In the field vegetative rest is about 90 days.
- 3) Vegetation duration decreased from the plantation in January to the one of November from 250 to 113 days. The mean weight of tuber per plant is in good correlation with the cycle duration.
- 4) Plantations from January to June possess a concentrated fading One year old bulbils, sown in December and in January gived plants with irregular vegetation cycle. One year or more old bulbils sown in February and after give vigorous plants with a cycle comparable to plants from normal seeds.

That lead to think that if internal evolution of bulbil induces the evolution of the plant issued from it under particular conditions, when days length increases environment influence is predominant on physiological status of the motherbulbil.

INTRODUCTION

A la Guadeloupe, les variétés de Dioscorea alata se plantent surtout de Mars à Juin pour la Basse-Terre suivant les possibilités en plants et d'Avril à Août en Grande-Terre pour éviter les sécheresses du carême.

Des essais de culture à contre saison réalisées en 1973-1974 nous avaient donné des médiocres résultats.

Plusieurs auteurs ont conduit des expérimentations cherchant à augmenter la disponibilité en tubercules de consommation, par:

apres la levée, les plantes recevront un engrais complet 15-12-30 a raison de 600 Kg par hectare; chaque plante recevra un tuteur.

Les autres bulilles sont réparties dans des filets et placées en salle conditionnée a 18° C et 80% d'hygrométrie pour ralentir leur évolution physiologique. Ces bulilles vont permettre de réaliser les plantations suivantes:

Avril	48 bulilles
Àout	12 "
Septembre	12 "
Octobre	12 "
Novembre	12 "

2) Pour 1980, avec des bulilles récoltées en décembre 1973 et laissées à la température ordinaire pour permettre une levée normale, nous réaliserons les plantations de Décembre 1979 (1) et Janvier 1980.

Avec les bulilles récoltées en Janvier 1980 et placées en salle conditionnée nous réaliserons 17 plantations successives de Février a Décembre 1980 puis de Janvier à Juin 1981; à cette date, les bulilles restant sont complètement desséchées et ne peuvent plus germer.

3) Des bulilles récoltées en Février 1981, placées en salle conditionnée à 18° C seront plantées a partir d'Avril 1981; si bien que d'Avril a Juin 1981 nous avons planté deux générations de bulilles ayant une différence d'âge d'un an.

Les différentes plantations réalisées sont résumées dans le tableau 1.

Parmi les observations réalisées, nous utiliserons ici:

- 1) Les levées individuelles constatées sur la 1^{re} tige émergeant du sol; elles nous permettent de déterminer l'intervalle entre la 1^{re} et la dernière
- 1) Les plantes-mères des bulilles étant les mêmes, la levée intervenant en 1980, nous considérons la plantation de décembre 1979 comme étant de 1980.

- des essais de conservation du tubercule consommable
- conservation des semences et réalisation de cultures échelonnées.
- des essais de désaisonnement avec activation de la germination

Si dans le premier cas, il s'agit de consommer des tubercules conservés, dans les deux autres cas, il s'agit bien d'obtenir des tubercules frais, c'est-à-dire d'envisager la culture de l'igname de façon ininterrompue à condition de disposer de semences.

En 1978-80, CLAIRON et ZINSOU ont conduit sur D. alata c.v. Lupias une expérimentation précise concernant "l'effet du vieillissement du tubercule-mère sur la croissance et le développement de la plante" ; mais les plantations échelonnées commençées en Avril se sont arrêtées en Septembre quant les tubercules conservés à la température ambiante et égérminés n'étaient plus disponibles.

Dans l'essai qui nous intéresse ici, il s'agissait d'abord d'obtenir du matériel végétal à un stade de développement relativement jeune et toute l'année pour du bouturage "in vitro". En utilisant la température de 18°C pour ralentir l'évolution physiologique des semences, nous avons réalisé 6 plantations entre Janvier et Décembre 1979.

Les premières observations sur le cycle végétatif de 8 cultivars appartenant aux 4 espèces D. alata, D. bulbifera, D. cayenensis, D. trifida, nous ont conduit à poursuivre l'expérience en 1980 et 1981.

Les résultats sont différents selon les variétés, ils pourront éventuellement être exprimés de façon statistique ultérieurement.

Nous nous intéressons au cultivar Tahiti, modèle du groupe de variétés défini par le même nom (DEGRAS, ARNOLIN, POITOUT, 1972) et étudié plus amplement par DEGRAS (1976). Ce cultivar est subsppontané, rustique, vigoureux, a une floraison femelle, une production importante de bulbillles, un tubercule allongé dont seule une partie basale plus ou moins importante est consommable.

MATERIEL ET METHODE

1) En 1979, des bulbillles de Tahiti sont récoltées le 29 janvier. Le même jour, 48 bulbillles sont placées à 40 cm sur des billons d'un mètre de large. Un mois

levée, de calculer lavée moyenne du lot, le temps d'adaptation dans le sol et le repos végétatif (2) des bulbillles tel que l'a défini EMILSSON et que l'ont utilisé MADEC et PERENNÉC (1960 pour la Pomme de Terre).

- 2) Les nombres de tiges pour les plantations de 1980.
- 3) les fanaisons individuelles.
- 4) les levées de dormance sur les tubercules-fils laissés en place apres fanaison.
- 5) le nombre et le poids de tubercules récoltés.

RESULTATS

Alors que la dormance (1) des bulbillles est déterminé à la température de conservation, les résultats obtenus au champ sont regroupés dans les diagrammes (1) pour 1979, (2) pour 1980 et les tableaux 2, 3, 4 et suivants.

1) Dormance et évolution des bulbillles conservées à 18° C.

Que ce soit pour 1979, 1980 ou 1981 les bulbillles conservées à 18° C ne germent qu'au mois de Septembre. La dormance à 18° C est ainsi évaluée à 225 jours apres récolte.

Nous constatons également que le pourcentage maximum de bulbillles donnant des germes est d'environ 60 p. 100. La croissance des germes est lente; elles atteindront une longueur maximale de 20 cm et se nécroseront.

En Janvier 1981, 40% des bulbillles récoltées en 1980 montrent le phénomène de boulage (2) apres 12 mois à 18° C.

Cela montre que la température de 18° C limite la production de germes des bulbillles, ralentit leur évolution physiologique, mais n'empêche pas cette évolution physiologique. Sans être exactement identique, c'est une action comparable à

-
- 2) repos végétatif: période suivant la récolte pendant laquelle le tubercule ne peut germer, même sous des conditions optima (température de 20° C et hygrométrie supérieure à 90 p. 100 pour la Pomme de terre).
 - 1) dormance: temps pendant lequel le tubercule peut être conservé sans germer à une température sub-optimale.
 - 2) boulage: production de tubercule-fils par le tubercule ou le germe par l'incubation du tubercule c'est-à-dire par son évolution physiologique.

celle des basses températures 2-4° C sur l' évolution physiologique du tubercule de Pomme de terre (PERENNÉC et MADEC, 1960).

2) Repos végétatif des bulbillles placées au champ

Que se soit pour 1979 ou pour 1980, dès la récolte, nous plaçons des bulbillles au champ, c'est-à-dire, en principe, dans des conditions favorables à la levée.

En 1979, le diagramme 1 montre qu' il faut attendre le 4 Avril soit 64 jours pour voir la première levée des bulbillles placées le 29 Janvier; cette levée s'étale ensuite jusqu'au 21 Mai, soit sur 48 jours; la levée moyenne calculée est au 3 Mai soit 93 jours après plantation (tableau 2).

Le diagramme 2 montre qu'en 1980, la levée moyenne des bulbillles plantées dès leur récolte le 29/12/79 intervient 145 jours après plantation.

Ces 2 nombres aussi différents représentent d'après la définition d'EMILSSON le repos végétatif des bulbillles de Tahiti; 2 sortes de considération peuvent expliquer cette différence.

1) l' état physiologique initial des bulbillles: en Janvier 1979 les bulbillles ont été récoltées à partir de plantes dont les dates de fanaison n'avaient pas été contrôlées, tandis qu' en décembre les bulbillles ont été récoltées sur des plantes dont la fanaison complète remontent à 10 jours en moyenne.

2) Les conditions au champ ne semblent pas les mêmes pour les mois de Décembre, Janvier et suivants: ainsi en 1980 nous voyons les plantations de janvier et de Février lever avant celle de Décembre; cela laisse à penser que les conditions au champ ne sont pas toujours optimales, ce qui est nécessaire pour mesurer la longueur du repos végétatif.

Le tableau 3 nous permet de constater que pour les plantations suivantes les bulbillles lèvent de plus en plus rapidement: 32 jours après pour la plantation d' Avril 1979, puis 12, 11, 11 et 13 jours après, tandis qu'en 1980 il faut attendre à partir d' Août 8, 13, 15, 15, 13 jours pour la levée moyenne.

Le temps minimum de 8 jours serait le temps nécessaire à une bulbillle dont la dormance est terminée pour s'adapter aux conditions du sol, pour qu'un massif méristématique a partir d' un stade donné continue son évolution (MATHURIN, 1977) et donne un germe émergeant du sol.

3) Durée de végétation et production

Le diagramme 1 montre que la danaison de la plantation de Janvier 1979 intervient en Janvier 1980 alors que celle des plantes de Novembre se fait en Avril, c'est-a-dire qu'une différence entre dates de plantation de 10 mois se ramène à une différence entre dates de fanaison de 3 mois (tableau 2). La plantation de Novembre occupe le sol beaucoup moins de temps que celle de Janvier, 126 jours contre 335 quand nous considérons à la fois le temps avant à levée et de la durée de végétation.

Les résultats de 1980 sont analogues, 159 jours d'occupation du sol pour la plantation de Novembre contre 362 pour celle de Janvier. L'ensemble de ces résultats se trouve dans le tableau 3.

Cependant cet avantage que constitue une occupation réduite du sol est lié à 1'inconvenant d'une faible production : en 1979, 231 g en moyenne par plante pour la plantation de Novembre contre 2 496 g pour celle de Janvier, en 1980, 202 g contre 4 477 g. D'après les résultats de 1980, il semblerait que le meilleur rapport durée de végétation/production soit obtenu avec la plantation de juin, 197 jours pour 2 130 grammes; mais il faudrait une analyse plus précise.

4) Nombre de tiges et nombre de tubercules produits

Le nombre de tiges d'une même plante varie au cours de la végétation, certaines tiges meurent, d'autres apparaissent.

Les observations portées dans le tableau 5 ont été faites en fin de végétation. Elles montrent pour 1980 d'abord un nombre de tiges relativement stable et supérieur à 2 de janvier à juillet, puis de juillet à décembre, ce nombre de tiges diminue lentement de 1,83 à 1,08.

Comme dans les travaux de CLAIRON et ZINSOU, le nombre de tiges varie donc au cours de végétation; mais alors que pour Lupias ce nombre de tiges augmente au cours des plantations successives d'avril à août, pour Tahiti, ce nombre est relativement stable.

D'autre part, à partir d' Août, nous constatons une diminution de ce nombre de tiges: les plantations de Novembre et Décembre n' ont plus qu' une tige ne portant pratiquement pas de ramifications.

Sur la plantation de Décembre, une seule plante donne une deuxième tige, mais cette deuxième tige au lieu d'apparaître peu de temps après la première tige comme pour les plantations précédentes d' Octobre et de Novembre (ou les suivantes à partir de Mars) apparaît à la mi-mai, 134 jours après la première, au moment où 5 plantes sur 12 avaient déjà fané. Cette jeune tige qui sort en même temps que de nouvelles tiges sur les autres plantations apparaît comme une nouvelle génération.

Le tableau 6 nous montre l'évolution du nombre de tiges d'une plante dans les mois qui suivent la plantation. Le tableau 7 nous donne l'évolution moyenne pour les plantations d'octobre 80 à Mars 1981 et le graphique 1 les courbes correspondantes. Les plantations de Janvier à Juin 1981 réalisées avec des bulbes agées de plus d'un an donnent un nombre élevé de tiges, ce nombre semble croître de Janvier à Mai en passant de 5,4 à 8,5.

Le tableau 7 et le graphique 1 nous montrent que le nombre de tiges des plantations de Janvier et Février est faible jusqu'à la mi-mai. La courbe de Janvier montre un net fléchissement en Avril, puis en Mai une brusque augmentation de ce nombre de tiges de 1,4 à 4,5. Au cours du mois de Mai le nombre moyen de tiges de la plantation de Février connaît lui aussi une forte élévation du nombre de tiges 1,63 à 3,09, mais le fléchissement d' Avril est moins net.

Les plantations de Mars et des mois suivants ne montrent pas de fléchissement, mais une apparition continue de tiges entre Avril et Juillet.

En Mai et Juin, l'observateur distingue pour les plantations de Janvier et Février 2 générations de tiges: les premières, sorties peu après la plantation montrent des feuilles en partie nécrosées et avec des taches diverses, les secondes plus jeunes, sorties à la mi-mai qui présentent des feuilles lisses.

Les bulbes récoltés en 1981 et plantés à partir d'Avril donnent un nombre de tiges relativement élevé (1,66 à 2,25) comparable au nombre de tiges obtenues avec les bulbes récoltées et plantées en 1980.

Nous remarquons que ce nombre est 3 fois moins élevé que le nombre de tiges produites par les bulbillles plus âgées d'un an et plantées simultanément.

En considérant les plantations de 1980, nous voyons que le nombre de tubercules est stable et égal à 1 de Décembre à Avril. A partir de la plantation de Mai, ce nombre augmente lentement de 1,08 à un maximum de 1,75 en Octobre puis semble décroître. En considérant les plantations de 1979, nous voyons que le nombre de tubercules varie peu, il atteint un maximum de 1,33 pour la plantation de Septembre.

Ainsi, l'évolution du nombre de tubercules obtenus a partir des bulbillles de Tahiti est la même que celui du nombre de tubercules obtenus à partir de Lupias, mais l'évolution est beaucoup moins importante pour Tahiti.

Quand nous considérons le nombre de tiges et le nombre de tubercules produits par Tahiti en 1980, nous voyons qu'il n'y a aucune corrélation entre ces caractères, la corrélation si elle existait serait plutôt négative.

5) Repos végétatif des tubercules au champ.

Les tubercules produits à l'exception des tubercules de janvier à juin 1980 sont laissés au champ sans être récoltés; les tubercules des plantations de janvier à juin 1980 sont récoltés après fanaison le 25 février 1981 et laissés au champ.

Le repos végétatif des tubercules après la fanaison du feuillage varie de 77 à 115 jours. Si le fait d'avoir récolté les tubercules semble accélérer la levée, les levées constatées ne permettent pas de trouver une influence de la date de plantation, de l'état physiologique du tubercule-mère à la plantation ou de la date de fanaison.

Nous pouvons noter en particulier que les massifs régénérateurs notés par MA-THURIN à partir de 6 mois de végétation sur le tubercule de Pacala, sont présents sur le tubercule de Tahiti et cela seulement à partir de 135 jours pour les plantations d'octobre et novembre. D'autre part, il faut considérer que le stade de ces massifs est le même après 135 jours sur la plantation de novembre qu'après 249 jours pour la plantation de Janvier.

Le repos végétatif du tubercule de Tahiti apparaît donc comme un caractère variétal stable: la moyenne calculée ici est de 94 jours.

DISCUSSION - CONCLUSION

Les expériences rapportées ici nous fournissent un certain nombre d'observations sur le cycle végétatif de Dioscorea aiata c.v. Tahiti.

- 1) Les bulbilles de Tahiti peuvent se conserver 17 mois à 18° C.
- 2) Quelle que soit l'époque de plantation, les bulbilles de Tahiti donnent au moins une tige et un tubercule. La question qui est posée est différente et consiste à savoir si nous pouvons obtenir une production commerciale à tout moment. A la densité utilisée de 25.000 plants/ha, nous constatons que 635g/plante soit 15.875 Kg/ha serait une production acceptable pour le mois d'Août sur l'ensemble du tubercule de Tahiti; il reste donc à étudier la fraction de tubercule consommable par récolte. En dehors de la fraction consommable, les résultats ne permettent pas d'envisager une production commerciale entre Septembre et Octobre.
- 3) Le nombre de tiges par plante est fonction de l'état de vieillissement de la bulbille. Mais ce rôle de la bulbille semence peut être totalement dominé par les conditions extérieures : les jours longs ou plus exactement les jours croissants seraient favorables à la production de tiges comme à un développement végétatif important; les jours décroissants seraient défavorables à la production de tiges. Les plantations de Décembre 1980 et de Janvier 1981 nous montrent clairement la prédominance de ces conditions extérieures sur l'état d'évolution interne de la bulbille tout au moins en ce qui concerne la production de tiges et le développement végétatif.
- 4) Il n'y a pas de relation stricte entre le nombre de tiges et le nombre de tubercule. Le nombre de tubercule serait en relation avec l'âge physiologique de la bulbille, le nombre de tubercules augmente avec les plantations tardives.

- 5) Le mois de Mai semble avoir une importance considérable sur la fin du repos végétatif de Tahiti et sa capacité de donner des tiges et des ramifications secondaires. Il reste à savoir si c'est une somme de photopériodes croissantes qui rentre en jeu ou au contraire une longueur de jour critique.
- 6) La fanaison de la plante dépend également des conditions extérieures: la plantation de décembre à fané après 146 jours tandis que celle de janvier 81 est en partie toujours en végétation après 170 jours de végétation.
- 7) Le repos végétatif de Tahiti ne dépend pas de l'état du tubercule mère au moment de la plantation ni des conditions extérieures à la fanaison de la plante. C'est un caractère stable qui peut être estimé à 94 jours.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- 1) DEGRAS L., ARNOLIN R., POITOUT R. (1972). Principales ignames introduites et cultivées aux Antilles françaises. Xth Annual Meeting C.F.C.S. Puerto Rico. pp. 93-97.
- 2) DEGRAS, L. (1976). Etude d'une igname D. alata L. bulbifère subspontanée aux Antilles. Journal d'Agric. Trop. et de Bot. Appl. tome XXIII, n° 7-12, 159-182.
- 3) CLAIRON, M., ZINSOU, C. (1980). Effet du vieillissement du tubercule sur la croissance et le développement. Séminaire International sur l'Ignane. Guadeloupe 28 juillet - 2 aout 1980.
- 4) MATHURIN, P. (1977). Données pour l'étude de la multiplication végétative de l'Ignane (Dioscorea spp). Anatomie du tubercule, fragmentation et essai d'activation de la germination. Mémoire d'études Ingénieur des Techniques Agricoles. INPSA. Dijon.
- 5) PERENNEC, P. et MADEC, P. (1960). Influence du tubercule sur la croissance et le développement du germe de Pomme de Terre. Annales de Physiologie Végétale. 1, 29-67.

Tableau 1

Origine des bulilles et plantations réalisées

Récolte de bulilles	Année	Plantations réalisées												
		Déc	J	F	M	Av.	Mai	J	J1	A	S	O	N	Déc.
Janvier 79	1979		1				2			3	4	5	6	
Décembre 79 (1980)	1980	1	2											
Janvier 80	{ 1980	-	-	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	{ 1981		14	15	16	19	18	19						
Février 81						1	2	3	4	5	6	7

Tableau 2

Levée des bulilles, fanaison, levée des tubercules,
moyennes calculées

Dates de l'plantation	1979			1980		
	Levée moyenne	Fanaison moyenne	Levée de tubercules	Levée moyenne	Fanaison moyenne	Levée de tubercules
29/12	-	-	-	30/5	25/1	18/4
29/1	3/5	12/1	25/4	13/5	6/2	25/4
28/2	-	-	-	22/4	24/1	20/4
29/3	-	-	-	21/5	27/1	21/4
29/4	6/6	24/1	19/5	2/6	1/2	22/4
29/5	-	-	-	22/6	2/2	22/4
29/6	-	-	-	16/7	7/2	24/4
29/7	-	-	-	9/8	13/2	19/5
29/8	4/9	6/2	21/5	6/9	16/2	16/5
29/9	7/10	23/2	28/5	10/10	27/2	20/6
29/10	6/11	17/3	21/6	11/11	24/3	5/7
29/11	12/12	20/4	17/7	12/12	3/5	14/8
29/12	-	-	-	13/1	9/6	25/9

Tableau 3

Temps d'adaptation des bulilles, repos végétatif et étalement de la levée

Dates de plantation	1979		1980		1980		1981	
	attente avant levée	étalement de la levée	attente avant levée	étalement	attente avant levée	étalement avant levée	attente avant levée	étalement
29/12	-	-	145	53	-	-	-	-
29/1	93	48	112	50	21	24	-	-
28/2	-	-	54	37	32	38	-	-
29/3	-	-	61	34	20	22	-	-
29/4	32	19	41	43	25	26	30	11
29/5	-	-	16	11	23	27	32	26
29/6	-	-	13	16	20	21	20	10
29/7	-	-	11	9	-	-	20	13
29/8	12	11	8	8	-	-		
29/9	11	4	13	17	-	-		
29/10	11	11	15	15	-	-		
29/11	13	14	16	14	-	-		
29/12	-	-	13	21	-	-		

Tableau 4
Occupation du sol et production de tubercules

Dates de plantation	1979			1980			Production
	Durée de végétation	Occupation du sol	Production	Durée de végétation	Occupation du sol	Production	
29/12	-	-	-	238	383	3688	
29/1	247	335	2496	250	362	4477	
28/2	-	-	-	273	327	2608	
29/3	-	-	-	229	290	3121	
29/4	225	257	2020	220	261	2294	
29/5	-	-	-	229	245	2209	
29/6	-	-	-	197	210	2130	
29/7	-	-	-	185	196	1118	
29/8	150	162	280	162	170	635	
29/9	133	144	430	131	144	202	
29/10	130	141	235	136	151	268	
29/11	113	126	231	143	159	202	
29/12	-	-	-	146	159	227	

Tableau 5
Nombre de tiges et nombre de tubercules

Dates de plantation	1979	1980		1981	
	Nbre de tubercules	Nbre de tiges	Nbre de tubercules	semences 80	semences 81
29/12	-	3,9	1,00	-	-
29/1	1,04	2,4	1	5,4	-
28/2	-	2,25	1	4,18	-
29/3	-	2,08	1	6,5	-
29/4	1,06	2,16	1	7,6	-
29/5	-	2,41	1,08	8,5	1,66
29/6	-	2,33	1,33	5,8	2,25
29/7	-	1,83	1,16	-	2,16
29/8	1,08	1,41	1,33	-	2,25
29/9	1,33	1,58	1,5	-	-
29/10	1,16	1,83	1,75	-	-
29/11	1,18	1,08	1,16	-	-
29/12	-	1,08	1,33	-	-

Tableau 6
Nombre de tiges après plantation pour une plante

	1er mois	2è mois	3è mois	4è mois	5è mois
Octobre	3	3	3	3	3
Novembre	2	2	2	2	2
Décembre	1	1	1	1	2 Mai
Janvier	1	1	1	9 Mai	14
Février	1	2	6 Mai	6	8
Mars	5	12 Mai	16	16	16

Tableau 7

Nombre moyen de tiges après plantation


Dates de plantation	1er mois	2è mois	3è mois	4è mois	5è mois
Octobre	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
Novembre	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Décembre	1	1	1	1	Mai 1,08
Janvier	1,0	1,4	1,4	Mai 4,6	5,0
Février	0,9	1,6	Mai 3,09	3,90	4,18
Mars	2,25	Mai 3,83	5,25	6,5	6,5


Tableau 8

Repos végétatif des tubercules laissés au champ

Dates de plantation	1979	1980
29/12	-	83
29/1	103	79
28/2	-	86
29/3	-	84
29/4	115	82
29/5	-	81
29/6	-	77
29/7	-	96
29/8	105	90
29/9	95	113
29/10	94	101
29/11	87	101
29/12	-	106

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre





Graphique 1

Nombre moyen de tiges après plantation

Nbre de tiges

5

4

3

2

1

Mars

Janvier

Février

4. Octobre

Novembre

Décembre

45

40

35

30

Mois après plantation

